

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Климадинон®**

**Регистрационный номер:** П N014246/02

**Торговое наименование:** Климадинон®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт

**Лекарственная форма:**  
Капли для приема внутрь

**Состав:**

100 г препарата содержат

*Активный компонент:*

Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт жидкий\* (экстрагент – этанол 50 % (об/об)) (1:5) - 12 г

*Вспомогательные вещества:*

Натрия сахаринат, мяты перечной масло эфирное, этанол 96 % (об/об), вода очищенная.

\* - экстракт жидкий получают из корневищ с корнями цимицифуги кистевидной - *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. сем. Ranunculaceae.

**Описание**

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом. Возможна легкая опалесценция.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противоклимактерическое средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** G02CX04

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Механизм действия и составляющие компоненты корневищ с корнями цимицифуги кистевидной, способствующие облегчению климактерических симптомов, неизвестны.

Клинико-фармакологические исследования показывают, что применение препарата экстракта корневищ с корнями цимицифуги кистевидной уменьшает клинические проявления симптомов менопаузы, таких как «приливы» и повышенное потоотделение.

**Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

### **Показания к применению**

Препарат Климадинон® показан для облегчения симптомов менопаузы, таких как «приливы» жара и повышенное потоотделение.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к активному компоненту и/или к любому вспомогательному веществу в составе препарата.

Беременность и период грудного вскармливания.

Возраст до 18 лет.

У пациенток с алкоголизмом (или излечившихся от алкоголизма), так как в состав препарата входит этанол.

Из-за содержания эфирного масла мяты перечной препарат Климадинон® нельзя принимать пациенткам с бронхиальной астмой или другими заболеваниями дыхательных путей, сопровождающимися выраженной повышенной чувствительностью дыхательных путей. Попадание раствора препарата Климадинон® в дыхательные пути может привести к бронхоспазму.

### **С осторожностью**

У пациенток с заболеваниями печени (только после обследования функции печени), эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

### **Применение во время беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата Климадинон® противопоказано в период беременности и грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутри, по 30 капель ежедневно, 2 раза в сутки, в одно и то же время (утром и вечером).

***Препарат Климадинон® не следует применять более 6 месяцев без консультации врача.***

При использовании препарата флакон следует держать в вертикальном положении.

Перед применением взбалтывать!

### ***Применение препарата в особых клинических группах***

***Дети и подростки до 18 лет***

Применение препарата Климадинон® у детей и подростков до 18 лет не показано.

***У пациенток с нарушением функции почек***

Для конкретных рекомендаций по режиму дозирования препарата у пациенток с почечной недостаточностью достаточных клинических данных нет.

***У пациенток с нарушением функции печени***

Применение препарата Климадинон® у пациенток с нарушением функции печени возможно только после консультации с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому показанию, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. При отсутствии эффекта от проводимой терапии или ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

### **Побочное действие**

На фоне лечения препаратами цимицифуги были зарегистрированы случаи нарушения функции печени (включая гепатит, желтуху, повышение активности «печеночных» трансаминаз). Сообщалось также о кожных реакциях (крапивница, кожный зуд, кожная сыпь), отеке лица, периферических отеках, нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта (диспепсия, диарея).

Оценить частоту возникновения нежелательных реакций на основании имеющихся данных невозможно. Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки не зарегистрированы. В случае передозировки – симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами в настоящее время не известны.

### **Особые указания**

Применять препарат Климадинон® пациенткам с нарушением функции печени следует с особой осторожностью и только после консультации врача. Перед началом терапии препаратом следует провести обследование функции печени.

При возникновении симптомов поражения печени (появление желтушности кожи и склер, повышенной утомляемости, потери аппетита, потемнения мочи, тошноты, рвоты, болей в верхней части живота) следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Пациенткам, получающим или получавшим лечение по поводу рака молочной железы или других гормонозависимых опухолей, препарат Климадинон® не следует принимать без предварительной консультации с врачом.

При возникновении кровотечения из половых путей или появления других симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Препарат Климадинон® не следует принимать одновременно с эстрогенами без предварительной консультации с врачом.

Препарат содержит этанол, в связи с чем, не следует применять препарат пациенткам с алкоголизмом или излечившимся от алкоголизма.

В случае диагностирования беременности прием препарата следует прекратить.

В процессе хранения возможна легкая опалесценция (помутнение), что не влияет на качество и эффективность препарата.

Для пациенток с сахарным диабетом: разовая доза препарата не содержит релевантных учитываемых хлебных единиц (ХЕ).

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Исследований влияния препарата Климадинон® на способность управлять транспортными средствами и механизмами не проводилось.

### **Форма выпуска**

Капли для приема внутрь. По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством сверху и навинчивающейся крышкой с предохранительным кольцом. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке (флакон, пачка картонная), при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия флакона: не более 6 месяцев.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

**Производитель**

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей**

Общество с ограниченной ответственностью «Бионорика»

119619 г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1.

тел./факс (495) 502-90-19,

адрес электронной почты: [info@bionorica.ru](mailto:info@bionorica.ru)